



لعبة - سيناريوهات الرعاية الصحية ومعدات الوقاية الشخصية صور يتعين طبعها وقصها



السيناريوهات (طبعها، وقصها، وخطها)



أنا أستعد لدخول غرفة مريض معزول بسبب تأكيد إصابته بمرض السل الرئوي من أجل تسجيل علاماته الحيوية.
أنا أستعد لدخول غرفة مريض معزول بسبب إصابته بالتهاب السحايا بالمكورات السحائية من أجل إعطائه مضاداً حيوياً عن طريق القسطرة الوريدية.
علي إجراء قسطرة وريدية لمريض معزول بسبب إصابته ببكتيريا معوية شديدة العدوى يمكن أن تنتقل عن طريق الملامسة المباشرة وغير المباشرة.
علي مساعدة مريض في العزل الوقائي لغسل نفسه.
علي إجراء فحص دم لمريض معزول يشتبه في إصابته بحمى نزفية فيروسية.
علي إحضار مريض يعاني من مرض السل الرئوي لإجراء صورة أشعة سينية لصدره.
علي تسجيل العلامات الحيوية لمريض يشتبه في إصابته بحمى نزفية فيروسية.
علي العناية بجرح مريض معزول بسبب المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين.

لعبة سيناريوهات الرعاية الصحية ومعدات الوقاية الشخصية الإجابات


	معدات الوقاية الشخصية
أستعد لدخول غرفة مريض تم تأكيد إصابته بالسل الرئوي للتو من أجل تسجيل علاماته الحيوية.	
لماذا؟ للحماية من الانتقال عبر الهواء ↔ قابلة لإعادة الاستعمال من قبل مقدم الرعاية نفسه لمدة أسبوع.	

	معدات الوقاية الشخصية
سأقوم بإعطاء مضاد حيوي عن طريق الوريد للمريض الذي يعاني من التهاب السحايا بالمكورات السحائية	
لماذا؟ للحماية من انتقال العدوى عن طريق القطرات + الاحتكاك إن ارتداء القفازات عند ملامسة أنبوب الحقن الوريدي للمريض (إعطاء الدواء عن طريق الوريد) هو إجراء وقاية أساسي.	

لعبة سيناريوهات الرعاية الصحية ومعدات الوقاية الشخصية الإجابات

	معدات الوقاية الشخصية
علي إجراء قسطرة وريدية لمريض يشتبه بإصابته بالكوليرا	
لماذا؟ للحماية من الانتقال عن طريق الاحتكاك ↔ إجراءات وقاية إضافية التخلص من القفازات والثوب مباشرة بعد الاستعمال	
	معدات الوقاية الشخصية
	
	
	معدات الوقاية الشخصية
علي تسجيل العلامات الحيوية لمريض مشتبه بإصابته بحمى نزفية فيروسية	معدات الوقاية الشخصية: رداء/زي خاص لفيروس إيبولا 

لعبة سيناريوهات الرعاية الصحية ومعدات الوقاية الشخصية الإجابات

	معدات الوقاية الشخصية
	معدات الوقاية الشخصية: رداء/زي خاص لفيروس إيبولا 
	معدات الوقاية الشخصية
علي إحضار مريض يعاني من مرض السل الرئوي لإجراء صورة أشعة سينية لصدره. لماذا؟ للحماية من الانتقال عبر الهواء، يجب إبقاء القناع التنفسي جاهزاً لمقدم الرعاية في حال أزال المريض الكمامة. تخلص من الكمامة الجراحية فوراً بعد الاستخدام. يمكن استخدام القناع التنفسي من قبل مقدم الرعاية الصحية نفسه حتى أسبوع واحد.	قناع تنفسي للمعالج  كمامة جراحية للمريض 
 علي العناية بجرح مصاب بالمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين	معدات الوقاية الشخصية
لماذا؟ للحماية من الانتقال عن طريق الاحتكاك تخلص من القفازات والرداء مباشرة بعد الاستعمال	  